

## 新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社 コミナティ®）

以下の方は接種できません。

- ① 明らかに発熱している方(BT 37.5℃)
- ② 重い急性疾患にかかっている方
- ③ 本ワクチンの含まれるポリエチレングリコール(PEG)に重度に過敏な方  
(一般的なアレルギーのお病気のある方は接種対象となります)
- ④ 接種を受けるのに不適當な状態の方

\*\*\*\*\*

### ●注意事項

待合室では周囲にいる方との会話を御控え下さい。

肩をすぐにだせるようにご準備下さい。

接種後 15 分の待機が必要になります。

注射部位はもまないで下さい。入浴はできます。

激しい運動やアルコールは御控え下さい。

血液をサラサラにする薬を飲んでいる方は接種部位を 2 分以上しっかり圧迫して下さい。

\*\*\*\*\*

### ●ワクチンの効果

接種していない方と比べて、感染を 95%減らします。また重症になることや周囲への感染も減らします。変異株でも効果があるとされています。

1 回目を接種して 2 週間ぐらい経つと効果が出始めます。

2 回目は 1 回目から 3 週間後です。(米国 CDC では 6 週間以内までは有効とされています)

ワクチン接種完了の基準は 2 回目接種後 2 週間となります。

\*\*\*\*\*

### ●副作用

20 万回の接種に 1 回ぐらいの確率でアナフィラキシーの報告があります。

そのため接種後に体調の変化がでた場合は受付におっしゃって下さい。

接種部位の痛み、筋肉痛、頭痛、発熱を接種後に認めることがありますが、1~2 日でほぼ軽快される方がほとんどです。アセトアミノフェンという解熱鎮痛薬が使用できます。

埼玉県の相談窓口(24 時間対応) 0570-033-226

副作用のご相談も可能です。

もしくは当院までご連絡下さい。

文責 はらこどもクリニック 原 拓磨